


Disinfect Premium



Přípravek pro plošnou dezinfekci

- pěnivý
- vysoce koncentrovaný



SCHOPF
HYGIENE

CZ **Disinfect Premium** je pěnivý, vysoce koncentrovaný přípravek pro plošnou dezinfekci stájí a stájového prostředí. Mimo vynikající fázi odpařování, která způsobuje dezinfekci vzduchu, se **Disinfect Premium** vyznačuje i dlouhodobým a hlubinným účinkem proti bakteriím, plísním a virům.

Přípravek je zapsán v seznamu Německé Veterinární Společnosti – DVG

Účinně eliminuje choroboplodné zárodky a původce následujících nemocí:

Drůběž: Gumboro, Markova nemoc, aviární influenza (ptačí chřipka - H5N1), salmonelóza, Newcastle'ská nemoc, střevní infekce (kolibakterie), mykózy, ekzémy, stafylokokové, streptokokové, enterokokové a další.

Prasata: prasečí mor, Aujeszkyho nemoc, salmonelóza, dyzentérie (úplavice), parvoviroza, enterotoxémie, virusová onemocnění, prasečí erysipel (červenka), PIA, APP, PRRS, MKS, rhinitis atrophicans (sípavka prasat), myco-plasma, Pasteurella multocida (cholera drůbeže), chřipka, klostridie a další.

Hovězí dobytek: slinivka a kulhavka, IBR/IPV, BVD/MD, hovězí chřipka a další.

Oblast použití: **Disinfect Premium** je vhodný pro dezinfekci ploch a stájového zařízení ve stájích hovězího dobytka, prasat, nosných slepic a jiné drůbeže, v koňské stáji, na jatkách, útulků pro zvířata, inkubátorů, insemináčích stanic, veterinárních stanic atd.

Disinfect Premium je šetrný k materiálu a proto se dá aplikovat i na beton, dřevo, plast a kovové plochy. Přípravek můžete aplikovat například na podlahy, zdi, technické zařízení, transportní zařízení a další.

Disinfect premium nemá negativní účinky pro bioplynové stanice!

Návod k použití a dávkování:

Před dezinfekcí je nutno plochu důkladně očistit. Poté zředíte koncentrát podle následující tabulky a aplikujte 400ml na 1 metr čtvereční pomocí vysokotlakového čističe, pěnové pistole, konvenční injekční stříkačky nebo mlhového zařízení.

Aby se dosáhlo maximálního dezinfekčního účinku, je důležité dodržet expoziční časy. Doporučujeme plochy po dezinfekci opláchnout vodou. Po aplikaci zajistěte dostatečné větrání po dobu 10-12 hodin.

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
PfaffenstraÙe 1 · 83115 Neubuere
Tel. +49 8035 9026-0 · Germany
info@schopf-hygiene.de · www.schopf-hygiene.de

Aplikační koncentrace / minimální expoziční čas / aplikační množství:

Bakterie s výjimkou tuberkulózy:	Akutní dezinfekce	1%	2 hodiny	0,4 litry na m ²
	Preventivní dezinfekce	0,5%	1 hodina	0,4 litry na m ²
	Plísňě	1%	1 hodina	0,4 litry na m ²
	Viry	1%	1 hodina	0,4 litry na m ²
	omezená virucidní dezinfekce	1%	30 minut	0,4 litry na m ²

Další použití: Zamlžování : Zředte 1,5 litru přípravku na 1 litr vody a přidejte 250 ml-500 ml přísady pro zamlžování. Roztok je dostatečný pro 1000 m³.

Přípravek je určen pouze pro profesionální uživatele. Za následky neodborného použití neručíme.

První pomoc: Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný lékařský dohled nejméně 48 hodin po nehodě.

V případě vdechnutí zajistěte si přísun čerstvého vzduchu a vyhledejte lékaře. V případě bezvědomí uložte postiženou osobu do stabilní polohy na boku. Při obtížném dýchání, zajistit přívod kyslíku. Při nepravidelném dýchání nebo zastaví poskytnout umělé dýchání. Neposkytujte umělé dýchání z úst do úst ani z úst do nosu. Zvratky mohou obsahovat jedovaté složky. Ihned vyhledat lékaře.

V případě styku s kůží, ihned odstraňte kontaminovaný oděv. Kůži ihned opláchněte vodou a mýdlem. Je nutná okamžitá lékařská pomoc, protože neošetřené poleptání má za následek pomalé hojení ran.

V případě zasažení očí pootevírejte oční víčka a proplachujte oči pod tekoucí vodou po dobu 15 minut. Chránit nezraněné oko. Ihned vyhledat lékaře.

V případě požití vypláchněte ústa a napijte se dostatečného množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Jestliže dojde k zvracení spontánně, pijte hodně vody. Ihned vyhledejte lékaře.

Informace pro lékaře: symptomatická léčba; Při plicním podráždění se doporučuje léčba v první řadě s dexamethasonem-dosieraerosolem.

(Dekontaminace, vitální funkce).

Číslo šarže a doba použitelnosti: viz potisk.

Bezpečnostní pokyny: H290 Může být korozivní pro kovy. H301+H331 Toxický při požití. Toxický při vdechování. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H341 Podezření na genetické poškození. H350 Může vyvolat rakovinu. H371 Může způsobit poškození orgánů. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H411 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřčetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKO-LOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ:

Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ:

Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Účinné látky: 250 g/l Glutaral, 185 g/l Formaldehyd, 25 g/l Benzyl-(C12-C16)-alkyldimetylammoniumchloride

Nebezpečí určující látky: Glutaral, Formaldehyd, Methanol

Číslo oznámení k uvedení biocidního výrobku na trh: MZDR 20251/2012/SOZ



UN 2922

obsah: 10 l

