

CZ ICS 10 micro je tekutý insekticid, připraven k použití prostřednictvím mlhovacího zařízení, fogger rozprašovače nebo lakovací pistole. Tato aplikace umožňuje rychlé a jednoduché ošetření velkých farem o velikosti 2500 m². Přípravek se vyznačuje téměř okamžitým účinkem a působí i proti rezistentním druhům much ve stáji hovězího dobytka, prasat nebo nosných slepic. Po 4 až 5 týdnech použití přípravku lze předpokládat, že hubicí účinek jiných účinných látek v jiných produktech na hubení much, se může opět výrazně zlepšit.

Oblast použití:

Hubení much ve stáji hovězího dobytka, prasat, nosných slepic, koní a jiných chovatelských stanicích, hospodářských objektů, skladů a na jatkách.

Návod k použití

Aplikace

ICS 10 micro je připraven k použití. Neředte jej vodou. Nalejte ICS 10 micro do nádoby mlhovacího zařízení, fogger rozprašovače nebo do lakovací pistole. Poté aplikujte přípravek rovnoměrně do vzduchu vytvořením environmentální mlhy. Aplikujte také na povrchy upřednostňované mouchami, například na stěny, parapety, rámy dveří, pilíře, teplé zdi a plochy atd. Opakujte aplikaci po 3-4 dnech.

Aplikační spotřeba: 1000 ml ICS 10 micro = dostačující na plochu do 2500 m²

Časové období pro biocidní účinek: do 90 vteřin

Důležitá a praktická informace:

Dospělé mouchy tvoří jen 20% celkové populace. Proto je důležité hubit i muší larvy! Využijte speciální přípravky Fly tomb 4GR nebo Cyracid 2.0.

Poznámky:

Neaplikujte přípravek na akrylové trubky nebo polystyren. Během použití a v dalších 12 hodinách po použití zajistěte dostatečné větrání stáje. Přípravek kdykoli můžete odstranit pomocí vody a mýdla. Povrchy, které nemají být ošetřeny, před aplikací zakryjte. Přípravek se nesmí použít na potraviny, krmiva nebo pro přímou aplikaci na zvířata. Přípravek je určen pouze pro profesionální uživatele. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího skladování a použití přípravku.

do fogger
rozprašovače
a lakovací pistole



ICS 10 micro

mikro- mlžení

**Tekutý insekticid
na hubení much ve stáji
do mlhovacího zařízení, fogger
rozprašovače nebo lakovací pistole
- připraven k použití -**

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Pfaffensteinstraße 1 · 83115 Neubuern
Germany · Tel. + 49 (0) 8035/9026-0
www.schopf-hygiene.de

připraven k
použití

Skladování:

Uchovávejte obal těsně uzavřený, na suchém, chladném místě a mimo dosah dětí. Chraňte před teplem. Neskladujte společně s potravinami a krmivy.

Nakládání s odpady:

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Nesmí proniknout do podlaží/půdy. Likvidace podle úředních předpisů. Nekontaminované a zbytků zbavené prázdné obaly mohou být opět použity. S kontaminovanými obaly zacházet jako s látkou samotnou.

První pomoc:

Při vdechnutí zajistěte si přísun čerstvého vzduchu, v případě potíží vyhledejte lékaře.

Při styku s kůží umyjte pokožku důkladně mýdlem a vodou.

Při zasažení očí pootevřete oční víčka a promývejte oči minimálně 15 minut pod tekoucí vodou. Poté se ihned poraďte s očním lékařem.

Při požití ihned vypláchnout ústa a zapít velkým množstvím vody. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Ihned vyhledejte lékaře.

Číslo šarže a doba použitelnosti: viz potisk

Bezpečnostní pokyny:

- H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
- H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
- P260 Nevdechujte výpary.
- P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chránič sluchu.
- P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501 Odstraňte obsah/obal podle národních předpisů o likvidaci odpadu.

Účinné látky:

6 g/l Chrysanthemum cinerariaefolium extract,
4 g/l Tetramethrin, 8 g/l Piperonylbutoxid



nebezpečí



4 027693 001110

Obsah: 1000 ml

UN 3082

UFI: EJQR-46GX-V99T-UFA2